«УТВЕРЖДЕНО»
Фармакологический комитет
Государственного учреждения
«Центр безопасности фармацевтической
продукции» Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан
«4» 02 2026 г. № 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФАНИГАН® ФАСТ

Торговое название препарата: Фаниган® Фаст
Действующие вещества (МНН): диклофенак диэтиламин, метилсалицилат, ментол, льняное масло
Лекарственная форма: гель для наружного применения
Состав:
каждый грамм геля содержит:
активные вещества: диклофенака диэтиламин эквивалентно диклофенаку натрия 10 мг, метилсалицилат 100 мг, ментол 50 мг, льняное масло 30 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, карбомер 940, динатрия ЭДТА, полисорбат 80, бензиловый спирт, гидроксид натрия, очищенная вода.
Описание: однородный гель белого цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа: костно-мышечная система. Препараты для местного применения при мышечных и суставных болях. Нестероидные противовоспалительные препараты для местного применения. Диклофенак.
Код АТХ: M02AA15

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
При местном применении Фаниган® Фаст оказывает обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие. Устраняет боль и воспаление, уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов, способствует увеличению объема движений в суставах.
Действие Фаниган® Фаст геля обусловлено компонентами, входящих в его состав. Диклофенак ингибирует циклооксигеназу, угнетает биосинтез простагландинов - эндогенных веществ, которые играют важную роль в генезе лихорадки, воспалении и боли. Диклофенак снимает боль, устраняет воспаление.
Ментол вызывает раздражение холодовых рецепторов. Это сопровождается сужением и уменьшением проницаемости капилляров в месте его нанесения, ощущением прохлады. Оказывает местное отвлекающее действие, с умеренно выраженным обезболивающим эффектом, поглощение ментола является незначительным. Ментол метаболизируется в печени и выводится с желчью в виде глюкуронидов и почками.
Метилсалицилат представляет собой производное салициловой кислоты и обладает местнораздражающим действием. Вызывая раздражение рецепторов кожи, метилсалицилат приводит к уменьшению болевых ощущений. Кроме того, метилсалицилат тормозит синтез простагландинов, что уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей. При местном применении легко проникает через неповрежденную кожу вглубь воспалительного очага, создавая высокие терапевтические концентрации. В воспаленных тканях метилсалицилат гидролизуется и превращается в анион салициловой кислоты, который метаболизируется в печени в дигидроксибензойную кислоту и выводится почками. Период полувыведения составляет 2 часа.
Льняное масло, основной компонент альфа-линоленовой кислоты (этиловый эфир ненасыщенной жирной кислоты), оказывает противовоспалительный эффект, имеет антиоксидантные свойства, улучшает кровообращение в месте нанесения.

Действие Фаниган® Фаст геля начинается уже через несколько минут после нанесения на кожу. После 20–30 мин, гель достигает максимум эффекта. Исчезновение основных клинических симптомов отмечается обычно в первые дни от начала лечения.

Фармакокинетика

При применении в виде геля диклофенак медленно всасывается, проникая глубоко в подкожную жировую ткань, мышечную ткань, суставную капсулу и синовиальную жидкость с помощью прямого проникновения. При длительном лечении или при нанесении на большие участки повреждения, диклофенак постепенно проникает в плазму крови (3–6% от дозы, нанесенной на кожу). После длительного применения геля по схеме три раза в день, 2,5 г (10 мг/см^2) в течение 3 дней, стабильная концентрация диклофенака в плазме составляет 20-40 нмоль/л, в синовиальной жидкости составляет 370 нмоль/л, в синовиальной ткани - 410 нмоль/л. Концентрация в синовиальной жидкости остается достаточно стабильно, в то время как быстро уменьшается в плазме. Диклофенак метаболизируется в печени путем конъюгации с глюкуроновой кислотой. Около 70% диклофенака выводится с мочой, остальное - с калом.

Метилсалицилат при местном применении, быстро впитывается и проникает в подкожную клетчатку, мышцы и суставную капсулу и посредством гидроксилирования, превращается в анион салициловой кислоты.

Показания к применению

Местное лечение воспалительных и дегенеративных форм заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые сопровождаются болью и отеком, такие как ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), острая подагра, псориатический и посттравматический артрит, ревматические повреждения мягких тканей (тендинит, бурсит, миозит), дегенеративные заболевания суставов (артрозы крупных и мелких суставов), остеохондроз тела позвонка, миалгия, невралгия, пояснично-крестцовый радикулит, боли после травм, связочная вялость, растяжение связок, мышц, сухожилий, боль в мышцах и суставах, индуцированная физической активностью.

Способ применения и дозы

Дозировка

В зависимости от площади болевого участка 2–4 г геля (полоска 4–8 см) наносят тонким слоем на кожу и легко втирают 2–3 раза в сутки. Средняя суточная доза составляет 10 г геля, что соответствует 100 мг диклофенака натрия. Наносить препарат следует на неповрежденную кожу, избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Нельзя наносить гель на открытые раны. Продолжительность курса лечения не должна превышать 10 дней без консультации с врачом.

Способ применения

Местно - для наружного применения.

Побочные действия

Редко

- кожная сыпь, отек и волдыри, папулы, чешуйки, покраснение
- сухая кожа
- покалывание или жжение
- зуд, крапивница

В отдельных случаях

- появление генерализованной сыпи
- развитие реакций гиперчувствительности в виде отека лица (отек Квинке)
- одышка
- фотосенсибилизация

При применении Фаниган® Фаст геля на обширных участках кожи возможно развитие системных побочных эффектов:

- изжога, тошнота, рвота, диарея
- боли в животе

- повышение активности печеночных трансаминаз
- головная боль, головокружение
- гематурия
- анафилактический шок, кожная сыпь
- анемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз
- длительное кровотечение

Противопоказания

- повышенная чувствительность к диклофенаку и другим ингредиентам;
- повреждение эпидермиса, открытые раны в области применения;
- астматический статус у пациентов, получающих аспирин;
- аномальное строение клеток крови неуточненной этиологии;
- острая стадия гастрита и дуоденита;
- беременность и лактация;
- дети до 12 лет (недостаточно данных о наружном применении препарата в этой возрастной группе).

Лекарственные взаимодействия

Фаниган® Фаст гель может использоваться наряду с другими лекарственными средствами, потому что компоненты этого препарата не взаимодействуют с ними системно, включая применение диклофенака натрия при пероральном применении. Но в случае длительного использования Фаниган® Фаст геля в большой дозе, необходимо знать, что диклофенак может усиливать эффект антикоагулянтов, глюкокортикостероидов, препаратов лития, а также ослаблять действие фуросемида и тиазидных диуретиков. Это может повышать концентрацию дигоксина в плазме крови, снижать переносимость других нестероидных противовоспалительных средств, усиливая их ульцерогенное действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Совместное наружное применение некоторых лекарственных средств, содержащих N-ацил-этаноламина-кислоту-амидазы, может вызвать раздражение кожи локально в виде крапивницы, покраснения, шелушения.

Особые указания

При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо провести дополнительное обследование и скорректировать лечение. Пациентам, у которых в анамнезе наблюдалась повышенная чувствительность при местном применении ацетилсалициловой кислоты, других салицилатов либо иных нестероидных противовоспалительных препаратов (приступы астмы, кожные реакции или вазомоторный ринит), препарат применяют с осторожностью, и только после тщательной оценки пользы и ожидаемых рисков. Гель Фаниган® Фаст следует применять с осторожностью, при наличии в анамнезе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения функции печени или почек, аномального строения клеток крови, полипоза слизистой оболочки носа. После нанесения геля следует вымыть руки, чтобы избежать попадания остатков препарата на слизистые оболочки и в глаза.

Пациенты детского возраста

Нет данных относительно безопасности применения препарата у детей до 12 лет.

Применение при беременности и в период лактации

Не допускается применять гель на больших участках тела или использовать в течение длительного времени в последние три месяца беременности и во время лактации, поскольку нет данных о безопасности препарата для плода и новорожденного.

Вопрос приеменения препарата в течение беременности и в период лактации решает только врач.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами

Фаниган® Фаст гель не имеет никакого влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Передозировка
Передозировка невозможна в результате местного применения геля Фаниган® Фаст.
При случайном приеме внутрь лечение такое же, как при отравлении нестероидными противовоспалительными препаратами. Пациенту следует обратиться за медицинской помощью.
Симптоматическое лечение проводится в случае появления признаков осложнений, таких как повышенное артериальное давление, почечная недостаточность, судороги, угнетение дыхания, желудочно-кишечные расстройства.

Форма выпуска
По 30 г или 100 г геля в ламинированной тубе. Одна такая туба в картонной упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не замораживать!

Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта

Производитель
Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Адрес производства
SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ИП ООО «BARAKA DORI FARM»
100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули, д. 91.
Тел.: +998 (78) 150 97 97; Факс: +998 (78) 150 97 87;
Сот.:+998 (93) 388 87 82;
E-mail: pv@kusum.uz
Web-сайт: kusum.uz