

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЛЮТ® АСТЕЗИН

Торговое название препарата: Флют® Астезин

Действующее вещество (МНН): бензокаин

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав:

Каждый суппозиторий ректальный содержит:

активное вещество: бензокаин 206 мг;

вспомогательные вещества: метилпарабен, пропилпарабен, кукурузный крахмал, масло какао рафинированное.

Описание: от белого до светло-желтого цвета суппозитории в форме торпеды.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Местные анестетики.

Код АТХ: C05AD03

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Бензокаин обратимо стабилизирует мембрану нейрона, что снижает ее проницаемость для ионов натрия.

Подавляется деполяризация мембраны нейрона, блокируется формирование и проведение нервного импульса. Таким образом, бензокаин проявляет выраженный местноанестезирующий эффект.

Фармакокинетика

Продукт предназначен для местного применения. Бензокаин, входящий в его состав, выводится со слюзью или, в крайне малых количествах, почками.

Показания к применению

Наружный и внутренний геморрой, трещины, эрозии и микротравмы в области ануса, перианальный зуд с выраженным болевым синдромом. В качестве обезболивающего после проктологических оперативных вмешательств.

Способ применения и дозы

Препарат следует применять после гигиенических процедур. Вводить по 1 суппозиторию в задний проход утром, после дефекации и перед сном. Суточная доза - не более 4 раз в сутки. Регулярное применение препарата обеспечивает стойкий терапевтический эффект, уменьшение симптомов геморроя. Продолжительность лечения обычно составляет 1 неделю. При необходимости он может быть продлен до 3 недель и более (после консультации с врачом).

Побочные действия

В редких случаях наблюдались следующие нежелательные эффекты:

- контактный дерматит;
- кожные аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, зуд).

Крайне редко высокие дозы бензокаина могут вызывать метгемоглобинемию: цианоз кожи, губ и ногтевых пластинок, головную боль, головокружение, диспноэ (одышку), утомляемость и тахикардию.

Если какой-либо из этих эффектов сохраняется или усиливается, следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Данный препарат противопоказан следующим пациентам имеющих:

- Повышенную чувствительность к любому из компонентов препарата;
- тромбоэмболическую болезнь;
- гранулоцитопению;
- детям младше 12 лет.

Лекарственные взаимодействия

Не рекомендуется применять препарат одновременно с применением ингибиторов МАО, антидепрессантов или гипотензивных препаратов без наблюдения врача.

Особые указания

Перед применением следует проконсультироваться с врачом в следующих случаях:

- тяжелая артериальная гипертензия;
- грубое нарушение сердечного ритма;
- клинически выраженный тиреотоксикоз;
- нарушение мочеиспускания.

В случае обильных кровянистых анальных выделений или при сохранении симптомов более 7 дней следует обратиться к проктологу.

Детям до 12 лет: препарат можно применять только по назначению врача.

Используйте наименьшее необходимое количество препарата. Поступали сообщения, которые предполагают, что применение препаратов бензокаина может вызывать метгемоглобинемию. Такие симптомы, как цианоз (бледный, серый или синий цвет кожи, губ и ногтевых пластинок), головная боль, головокружение, диспноэ (одышка), утомляемость и тахикардия, возникающие при лечении, могут указывать на потенциально опасную для жизни метгемоглобинемию и требуют немедленного медицинского вмешательства.

Пациенты с проблемами дыхания, такими как астма, бронхит или эмфизема, пациенты с сердечными заболеваниями и пациенты, которые курят, подвергаются большему риску осложнений, связанных с метгемоглобинемией.

Младенцы в возрасте до четырех месяцев, пожилые пациенты и пациенты с некоторыми врожденными дефектами, такими как дефицит глюкозо-6-фосфодиэстеразы, болезнь гемоглобина-М, дефицит NADH-метгемоглобинредуктазы (диафоразы 1) и дефицит пируваткиназы, также могут иметь повышенный риск развития метгемоглобемии.

Применение при беременности и в период лактации

При беременности и в период лактации препарат следует применять только после оценки врачом соотношения риска и пользы.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами

Сообщений о влиянии на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не поступало.

Передозировка

При значительном превышении рекомендуемых доз может наблюдаться тенденция к ускоренному свертыванию крови.

Системная абсорбция бензокаина при передозировке может проявляться сонливостью, тревогой, возбуждением и в тяжелых случаях судорогами. Поступали сообщения, которые предполагают, что применение препаратов бензокаина может вызывать метгемоглобинемию. Такие симптомы, как цианоз (бледный, серый или синий цвет

кожи, губ и ногтевых пластинок), головная боль, головокружение, диспноэ (одышка), утомляемость и тахикардия, возникающие при лечении, могут указывать на потенциально опасную для жизни метгемоглобинемию и требуют немедленного медицинского вмешательства.

Другие симптомы могут потребовать прекращения применения препарата и симптоматического лечения.

Форма выпуска

По 6 суппозиторий в ПВХ/ПЭ стрипах. По 1-му или 2 таким стрипа в картонной упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Kusum Healthcare Pvt. Ltd Индия.

Адрес производства

SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули 91

Тел.: + 998 78 150 97 97; факс: + 998 78 150 97 87

Сот.: + 998 93 388 87 82

E-mail: pv@kusum.uz

Web-сайт: kusum.uz