



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ КАТАРИЯ®

Торговое название препарата: Катария®

Действующее вещество (МНН): Натрия цитрат

Лекарственная форма: гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь

Состав:

Каждое саше (5.6 г гранул) содержит:

активное вещество: натрия цитрат 4,0 г;

вспомогательные вещества: сахароза, сахарин натрия и вкусовая добавка клюква 191121.

Описание: сыпучие гранулы от белого до почти белого цвета со вкусом клюквы.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие препараты для лечения урологических заболеваний.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Эффект цитрата натрия заключается в том, чтобы сделать мочу менее кислой.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Облегчение симптомов цистита у женщин.

Способ применения и дозы

Применение у женщин: содержимое одного пакетика растворить в стакане воды, принимать три раза в день в течение двух дней.

Применение у мужчин и детей: не рекомендуется.

Побочные действия

Умеренный диурез.

Противопоказания

Пациенты с диабетом, сердечными заболеваниями, гипертонией, заболеваниями почек в анамнезе или те, кто придерживается диеты с низким содержанием соли. Во время беременности и лактации препарат противопоказан.

Лекарственные взаимодействия

Пациентам, принимающим литий, следует избегать препаратов, содержащих натрий, поскольку натрий преимущественно абсорбируется почками, что приводит к увеличению экскреции лития и снижению его уровня в плазме.

Ощелачиватели мочи не следует использовать с гексамином, так как он эффективен только в кислой моче.

Действие ряда лекарств может быть ослаблено или усилено защелачиванием мочи и снижением рН желудка, вызванными активным веществом препарата.

Особые указания

Если симптомы сохраняются после завершения двухдневного курса лечения, следует обратиться за медицинской помощью. Не превышайте указанную дозу.

Применение при беременности и в период лактации

Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами

Не влияет.

Передозировка

В маловероятном случае передозировки этого продукта лечение должно быть симптоматическим.

Чрезмерный приём цитрата натрия может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт и диарею. Чрезмерные дозы солей натрия могут привести к перегрузке натрием и гиперосмоляльности. Чрезмерный приём бикарбонатов может привести к гипокалиемии и метаболическому алкалозу, особенно у пациентов с нарушением функции почек. Лечение симптоматическое и заключается в соответствующей коррекции водно-электролитного баланса.

Форма выпуска

Гранулы натрия цитрата упакованы в ламинированные саше из 4-х слойной фольги.

Каждое саше содержит 5,6 г гранул, по 6 саше вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Производитель

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Адрес производства

SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули 91

Тел.: + 998 78 150 97 97; факс: + 998 78 150 97 87

Сот.: + 998 93 388 87 82

E-mail: pv@kusum.uz

Web-сайт: kusum.uz