

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПАНАШ®

Торговое название препарата: Панаш®

Действующее вещество (МНН): тиоколхикозид

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав:

Каждый грамм крема содержит:

активное вещество: тиоколхикозид 2,5 мг;

вспомогательные вещества: карбомер (карбопол 940), динатрия эдетат, спирт изопропиловый, пропиленгликоль, глицерол (глицерин), гидроксид натрия пеллеты, легкий жидкий парафин, изопропилмиристат, полиоксил 40 гидрогенизованное касторовое масло, очищенная вода.

Описание: вязкий крем от бледно-желтого до желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: миорелаксант центрального действия

Код АТХ: M03BX05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Тиоколхикозид — это полусинтетическое производное колхикозида с миорелаксирующей фармакологической активностью.

Механизм действия

In vitro тиоколхикозид связывается с ГАМК-А и стрихнин чувствительными глициновыми рецепторами. Тиоколхикозид, действующий как антагонист ГАМК-А рецептора, может оказывать свое эффективное миорелаксирующее действие с помощью регуляторных комплексных механизмов на супраспинальном уровне, однако его глицинергические механизмы действия не могут быть исключены. Характеристики взаимодействия тиоколхикозида с ГАМК-А рецепторами такие же, как и с производным глюкуронида, который является основным метаболитом в кровотоке в качественном и количественном выражении.

Фармакокинетика

После местного применения рекомендованных доз Панаш® крема плазменный уровень тиоколхикозида был ниже минимального уровня.

Это доказывает, что при местном применении не происходит системное всасывание, а значит, это обеспечивает хорошую переносимость.

Показания к применению

Пояснично-крестцовый радикулит (боль в спине), цервикобрахиалгия (боль и контрактура мышц шеи, плеч, верхних конечностей), устойчивая ригидность затылочных мышц, посттравматический и послеоперационный болевой синдромы.

Адьювантная терапия болезненной мышечной контрактуры при острой патологии структур позвоночника у взрослых и подростков от 16 лет и старше.

Способ применения и дозы

Дозировка

Крем в достаточном количестве для пораженного участка слегка втирают в пораженную и близлежащую область кожи 2–3 раза в день. Продолжительность лечения варьирует, однако

курс 7–10 дней оказывается достаточным для выздоровления. Продолжительность курса определяется врачом.

Дети

Не применять препарат у детей младше 17 лет.

Способ применения

Крем для местного применения

Побочные действия

- имеются сообщения о высыпаниях и кожной сыпи.
- в редких случаях сообщалось о сонливости (см. «Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами»).

Противопоказания

Тиоколхикозид не следует применять в следующих случаях:

- повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата;
- вялый паралич;
- гипотония мышц;
- весь период беременности;
- период лактации;
- женщинам детородного потенциала, не использующим контрацепцию;
- тиоколхикозид назначают с осторожностью пациентам с приступами в анамнезе.

Лекарственные взаимодействия

Не известно.

Особые указания

Тиоколхикозид не рекомендуется для применения у детей.

В случае возникновения побочных эффектов дозу нужно уменьшить.

Особенно при длительном применении препаратов для местного применения может привести к повышенной чувствительности организма. В таком случае необходимо прекратить лечение и провести соответствующую терапию.

Панаш® крем содержит пропиленгликоль, что может вызвать раздражение кожи.

Применение при беременности и в период лактации

Беременность

Данные о применении тиоколхикозида у беременных женщин ограничены. Поэтому потенциальные факторы риска для эмбриона и плода остаются неизвестными.

В опытах на животных были обнаружены тератогенные эффекты.

Панаш® крем противопоказано применять при беременности и у женщин детородного возраста, не использующих контрацепцию.

Лактация

В связи с тем, что тиоколхикозид проникает в грудное молоко, его применение в период кормления грудью противопоказано.

Фертильность

Исследования фертильности у крыс не выявили влияние на способность к воспроизведению потомства в дозах до 12 мг/кг, т. е. в тех дозах, которые не имеют клинического эффекта. Тиоколхикозиды и его метаболиты в разных концентрациях обладают способностью вызывать анеугенность, что может быть фактором риска снижения фертильности у человека.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами

Хотя после применения Панаш® крема сонливость является редким побочным эффектом, рекомендуется учитывать возможность ее появления.

Передозировка

Данных о симптомах передозировки среди пациентов, получающих терапию тиokolхикозидом, не имеется. При появлении симптомов передозировки рекомендуется медицинское наблюдение и симптоматическая терапия.

Форма выпуска

По 30 г крема в гибкой алюминиевой тубе. Каждая туба вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать!

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Производитель:

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Адрес производства:

SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули 91

Тел.: + 998 78 150 97 97; факс: + 998 78 150 97 87

Сот.: + 998 93 388 87 82

E-mail: pv@kusum.uz

Web-сайт: kusum.uz