

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПИРАНТЕЛ

Торговое название препарата: Пирантел

Действующее вещество (МНН): пирантел

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

Каждая таблетка содержит:

активное вещество: пирантела памоат эквивалентно пирантелу 250 мг;

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (РН 102), кукурузный крахмал, кроскармеллоза натрия, повидон (PVP K-30), коллоидный диоксид кремния, магния стеарат и очищенная вода.

Описание: жёлтые таблетки капсулообразной формы, с разделительной полосой на одной стороне.

Фармакотерапевтическая группа: Антигельминтные препараты. Препараты для лечения нематодоза. Производные тетрагидропиримидина. Пирантел.

Код АТХ: P02CC01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пирантела памоат – противогельминтное средство. Препарат действует путем паралича нервной системы кишечных паразитов (глистов). Затем паразит выходит со стулом. Пирантел можно назначать независимо от приема пищи или времени суток, при этом очистка кишечника не требуется до или во время терапии. В редких случаях для устранения остриц или круглых червей была необходима вторая доза. Пирантел можно принимать с молоком или фруктовым соком.

Фармакокинетика

Пирантела памоат практически не всасывается из пищеварительного тракта (менее 3,5%). После применения разовой дозы 10 мг/кг массы тела концентрация пирантела в плазме незначительна – от 0,05 до 0,13 мг/мл в течение 1–3 часов. Пирантела памоат, всасываясь в кровь, метаболизируется в печени. Основным метаболитом является N-метил-1–3-пропандиамин, почти 1,2–4,6% его выводится с мочой. Более 93% выводится в неизмененном виде с калом.

Показания к применению

Таблетки пирантела показаны для лечение гельминтозов: аскаридоз, энтеробиоз, анкилостомоз, некатороз, трихостронгилез.

Способ применения и дозы

Дозирование

Назначают внутрь 1 раз в сутки в любое время: нет необходимости воздерживаться от приема пищи или принимать слабительные средства перед применением пирантела.

При энтеробиозе и сочетании энтеробиоза с аскаридозом взрослым и детям назначают препарат однократно в дозе 10 мг/кг массы тела или согласно следующей схеме:

Возраст	Доза препарата	
Дети от 3 до 6 лет	250 мг	1 таблетки
Дети от 6 до 12 лет	500 мг	2 таблетки

Дети старше 12 и взрослые с массой тела меньше 75 кг	750 мг	3 таблетки
Взрослые	1000 мг	4 таблетки

При тяжелых формах заражения назначают двойную дозу – 20 мг/кг в сутки на 1–2 приема в течение 2–3 дней.

Для профилактики повторного заражения рекомендован повторный прием пирантела через 3 недели в дозе 10 мг/кг.

При изолированном аскаридозе – 5 мг/кг в сутки однократно.

Побочные действия

Препарат обычно переносится хорошо.

Возможны: боль в эпигастриальной области, тошнота, рвота, диарея, анорексия; в редких случаях – головная боль, головокружение, сонливость, повышенная утомляемость, кожная сыпь, повышение активности печеночных трансаминаз.

Противопоказания

Применение таблеток пирантела противопоказано пациентам с повышенной чувствительностью к пирантелу памоату или к любому из вспомогательных веществ в составе, а также пациентам с печеночной недостаточностью.

Дети до 3 лет.

Лекарственные взаимодействия

Пиперазин: совместное применение пирантела и пиперазина может снизить эффективность пирантела.

Левамизол: токсичность пирантела увеличивается при одновременном применении с левамизолом.

Особые указания

При применении пирантела следует учитывать следующее:

Аллергия. Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо были какие-либо необычные или аллергические реакции на пирантел. Также сообщите своему врачу, если у вас аллергия на какие-либо другие вещества, например продукты питания, консерванты или красители.

Беременность. Пирантел не следует принимать во время беременности, если это не рекомендовано врачом. Исследования у беременных женщин не проводились. Однако в исследованиях на животных не сообщалось о том, что пирантел вызывает врожденные дефекты или другие проблемы.

Лактация. В организм всасывается лишь небольшое количество пирантела. Сообщалось, что пирантел не вызывает проблем у грудных детей. Однако пирантел не рекомендуется применять в период грудного вскармливания.

Дети. Это лекарственное средство было протестировано на ограниченном числе детей в возрасте 2 лет и старше, и не сообщалось, что в терапевтических дозах оно вызывает другие побочные эффекты или проблемы у детей, чем у взрослых.

Пожилые люди. Специальной информации, сравнивающей применение пирантела у пожилых людей с применением в других возрастных группах, нет.

Другие лекарственные средства. Когда вы принимаете пирантел, особенно важно, чтобы ваш лечащий врач знал, принимаете ли вы что-либо из следующего:

• *Пиперазин*: совместное применение пирантела и пиперазина может снизить эффективность пирантела.

Другие проблемы со здоровьем. Наличие других проблем со здоровьем может повлиять на применение пирантела. Обязательно сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо другие проблемы со здоровьем, особенно: болезнь печени.

Применение при почечной недостаточности: данные отсутствуют.

Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <10 мл/мин) рекомендуется соблюдать осторожность, так как может увеличиться системное воздействие.

Применение при нарушениях функции печени: пирантел противопоказан при нарушениях функции печени.

Применение при беременности и в период лактации

В экспериментальных исследованиях тератогенного эффекта у пирантела не обнаружено, но при беременности назначается с осторожностью.

Поскольку препарат практически не адсорбируется и не проникает в грудное молоко, нет необходимости прекращения кормления грудью при применении препарата в период лактации.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами

Данных нет.

Передозировка

Из-за низкой скорости всасывания концентрации в плазме также низкие. Вероятные последствия передозировки включают вегетативную дисфункцию, мышечный спазм, подергивания и слабость, протрацию и, в конечном итоге, асфиксию из-за мышечного паралича.

Лечение: Специфический антидот неизвестен. Могут быть целесообразны раннее промывание желудка и меры по поддержанию дыхания и артериального давления.

Форма выпуска

По 3 таблетки в ПВХ блистере, 1 или 10 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Производитель:

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Адрес производства:

SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули 91

Тел.: + 998 78 150 97 97; факс: + 998 78 150 97 87

Сот.: + 998 93 388 87 82

E-mail: pv@kusum.uz

Web-сайт: kusum.uz