



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПИРАНТЕЛ

**Торговое название препарата:** Пирантел

**Действующее вещество (МНН):** пирантел

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав:**

Каждая таблетка содержит:

*активное вещество:* пирантела памоат эквивалентно пирантелу 250 мг.

*вспомогательные вещества:* микрокристаллическая целлюлоза (РН 102), кукурузный крахмал, кроскармеллоза натрия, повидон (PVP K-30), коллоидный диоксид кремния, магния стеарат и очищенная вода.

**Описание:** жёлтые таблетки капсулообразной формы, с разделительной полосой на одной стороне;

**Фармакотерапевтическая группа:** противогельминтные препараты.

**Код АТХ:** P02CC01

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Пирантела памоат является противогельминтным средством. Деполяризующий эффект пирантела приводит к нарушению синаптической передачи в теле гельминтов (вызывая вначале ее усиление, а затем угнетение), развитию нейромышечной блокады и вследствие этого к спастическому параличу мышц гельминтов, способствуя их выведению с калом. Действует как на половозрелых, так и неполовозрелых особей, чувствительных к препарату, не действует на личинок в стадии миграции.

#### Фармакокинетика

Практически не всасывается из пищеварительного тракта (менее 3,5%). После приема разовой дозы 10 мг/кг массы тела концентрация пирантела в плазме крови незначительна – от 0,05 до 0,13 мг/мл в течение 1 - 3 ч. Пирантел, абсорбированный в системный кровоток, частично метаболизируется в печени. Основным метаболитом является N-метил-1-3-пропандиамин, около 1,2 - 4,6% которого выводится с мочой. Более 93% Пирантела выводится в неизменном виде с калом.

### Показания к применению

Лечение гельминтозов: аскаридоз, энтеробиоз, анкилостомоз, некатороз, трихостронгилез.

### Способ применения и дозы

#### Дозирование

Назначают внутрь 1 раз в сутки в любое время: нет необходимости воздерживаться от приема пищи или принимать слабительные средства перед применением Пирантел.

При энтеробиозе и сочетании энтеробиоза с аскаридозом взрослым и детям назначают препарат однократно в дозе 10 мг/кг массы тела или согласно следующей схеме:

Возраст	Доза препарата	
Дети от 3 до 6 лет	250 мг	1 таблетки



Дети от 6 до 12 лет	500 мг	2 таблетки
Дети старше 12 и взрослые с массой тела меньше 75 кг	750 мг	3 таблетки
Взрослые	1000 мг	4 таблетки

При тяжелых формах заражения назначают двойную дозу – 20 мг/кг в сутки на 1 - 2 приема в течение 2 - 3 дней.

Для профилактики повторного заражения рекомендован повторный приём Пирантела через 3 недели в дозе 10 мг/кг.

При изолированном аскаридозе – 5 мг/кг в сутки однократно.

При анкилостомозе, некаторозе, и сочетании некатороза с аскаридозом, или при других сочетанных заражениях гельминтами, препарат применяют в дозе 10 мг/кг в сутки в течение 3 дней или 20 мг/кг в сутки в течение 2 дней.

#### **Способ применения**

Для орального применения.

Детям до 3 лет препарат назначают в виде суспензии для перорального применения, таблетка Пирантел предварительно измельчается и смешивается с небольшим количеством воды.

#### **Побочные действия**

Препарат обычно переносится хорошо.

Возможны: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, анорексия; в редких случаях – головная боль, головокружение, сонливость, повышенная утомляемость, кожная сыпь, повышение активности печеночных трансаминаз; в отдельных случаях – нарушение слуха, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии. Аллергические реакции: зуд, крапивница, экзантема.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к препарату, печеночная недостаточность, миастения.

#### **Лекарственные взаимодействия**

При одновременном применении Пирантел с левамизолом токсичность последнего усиливается. Не следует применять Пирантел вместе с пиперазином, который проявляет по отношению к Пирантел антагонистическое действие.

Пирантел повышает концентрацию теофиллина в плазме.

#### **Особые указания**

Применение Пирантел не требует специальной подготовки и приема слабительных средств. В случае имеющихся заболеваний печени следует проинформировать врача.

Таблетки перед проглатыванием следует тщательно разжевывать.

При энтеробиозе следует провести одновременное лечение всех совместно проживающих лиц.

Для достижения эффекта при лечении энтеробиоза необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены, прежде всего детьми, а также повторный прием Пирантел через 3 недели.

После завершения курса необходимо контрольное исследование кала на наличие яиц гельминтов.

#### **Беременность и лактация**

В экспериментальных исследованиях тератогенного эффекта Пирантел не обнаружено, но при беременности назначается с осторожностью.

Поскольку препарат практически не адсорбируется и не проникает в грудное молоко, нет необходимости прекращения кормления грудью при применении препарата в период лактации.

**Влияние на способность управлять транспортным средством и другими механизмами**  
Данных нет.

#### **Передозировка**

При приеме препарата в очень высоких дозах может усиливаться его побочное действие. При передозировке промывают желудок, проводят мониторинг жизненно важных функций организма, проводят симптоматическую терапию. При наличии признаков антихолинэстеразного действия вводят атропин.

#### **Форма выпуска**

По 3 таблетки в ПВХ блистере, один блистер вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

По 10 картонных упаковок в групповом картонной коробке.

По 3 таблетки в ПВХ блистере, 10 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Препарат не следует применять после истечения срока годности.

#### **Условия отпуска**

По рецепту.

#### **Производитель**

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

#### **Адрес производства**

SP- 289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия.

#### **Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

ИП ООО "BARAKA DORI FARM"

100022, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули, д. 91.

Тел.: +99878 1509797; +99893 3888782

Факс: +99878 1509787

Email: [pv@kusum.uz](mailto:pv@kusum.uz)

Web-сайт: [kusum.uz](http://kusum.uz)