



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ КОЛИКИД®

**Торговое название препарата:** Коликид®

**Действующее вещество (МНН):** симетикон

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые оболочкой

**Состав:**

Каждая таблетка покрытая оболочкой содержит:

*активное вещество:* симетикон 125 мг;

*вспомогательные вещества:* магния-алюминия силикат, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кальция гидрофосфат безводный, кислота стеариновая, кремния диоксид коллоидный безводный, кросповидон, повидон К 29/32, Opadry II 85G 52218 желтый.

**Описание:** овальные, гладкие с обеих сторон таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** Средства, которые применяются при функциональных кишечных расстройствах. Силиконы.

**Код АТХ:** A03AX13

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Симетикон, который входит в состав препарата, – это нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество, изготовленное на основе кремния, является пеногасителем. Он изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, которые образуются в кишечнике, и вызывает их разрушение. Газы, которые высвобождаются при этом, могут как поглощаться стенками кишечника, так и выводиться из организма благодаря перистальтике кишечника. Применение симетикона до начала диагностических исследований органов брюшной полости предупреждает возникновение дефектов изображения, вызванных пузырьками газа; способствует тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным веществом, что предотвращает разрыв контрастной пленки даже в случае вздутия кишечника.

#### Фармакокинетика

Симетикон действует исключительно на поверхности пузырьков газа и не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта. Симетикон не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта и после перорального приема выводится в неизменном виде. Симетикон не оказывает центрального действия.

### Показания к применению

- симптоматическое лечение нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, связанных с газообразованием, например, метеоризм, в том числе в послеоперационный период;
- как вспомогательное средство при проведении диагностических исследований органов брюшной полости (рентгенография, ультразвуковое исследование) и при подготовке к гастродуоденоскопии;
- как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами).



### **Способ применения и дозы**

Таблетки Коликид® применять перорально взрослым и детям старше 12 лет. Прием препарата не зависит от приема пищи.

*Симптоматическое лечение при жалобах со стороны желудочно-кишечного тракта:* по 1 таблетке 3 раза в сутки.

*Как вспомогательное средство при проведении диагностических исследований органов брюшной полости:* по 1 таблетке 3 раза в сутки за день до исследования и еще 1 таблетку – утром в день его проведения.

*Как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами):* дозировка зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендованная доза – 3 таблетки.

Продолжительность курса лечения устанавливается индивидуально. При необходимости препарат можно принимать длительное время.

*Дети.*

Коликид®, таблетки, применяют детям в возрасте от 12 лет.

Детям в возрасте до 12 лет препарат назначают в виде жидких лекарственных форм.

### **Побочные действия**

*Со стороны иммунной системы:* аллергические проявления, реакции гиперчувствительности, включая зуд, кожную сыпь, крапивницу.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к препарату и его компонентам;
- кишечная непроходимость;
- обструктивные заболевания пищеварительного тракта.

### **Лекарственные взаимодействия**

Левотиросин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотиросина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом.

### **Особые указания**

При повторном появлении жалоб или при длительных жалобах со стороны пищеварительного тракта следует обратиться к врачу.

Препарат содержит лактозу. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

### **Применение при беременности и период лактации**

Клинических данных по применению препарата Коликид® беременными нет. Поскольку активный компонент не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта, не следует ожидать какого-либо действия лекарственного препарата на плод или накопления препарата в грудном молоке.

Применение препарата Коликид® в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами**

Поскольку симетикон является инертным веществом, не абсорбируется, влияние на управление автотранспортом или другими механизмами практически исключено.

### **Передозировка**

До сих пор случаи передозировки неизвестны. Поскольку симетикон в химическом и физиологическом отношении инертен, то интоксикация практически исключена. При использовании доз, больших, чем рекомендовано, следует обратиться к врачу.

**Форма выпуска**

По 15 таблеток в блистере; по 1, 2 или по 4 блистера в картонной упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО «КУСУМ ФАРМ».

**Местонахождение**

Украина, 40020, Сумская область, г. Сумы, ул. Скрябина, 54.

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан**

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, д. 16А.

Тел.: +(99878) 150 97 97; факс: +(99878) 150 97 87

Сот: +(99893) 388 87 82

E-mail: pv@kusum.uz