



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕМОВ

Торговое название препарата: Ремов

Действующее вещество (МНН): диметикон

Лекарственная форма: лосьон

Состав:

Каждый мл лосьона содержит:

активное вещество: диметикон 4%;

вспомогательное вещество: циклометикон 5

Описание: чистый, прозрачный, однородный лосьон, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: эктопаразитицид, вкл. противочесоточное средство

Код АТХ: P03AX05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Диметикон используется во многих фармацевтических и косметических препаратах. Было установлено, что 4% концентрация влияет на физико-физиологическую активность вшей. Менее активным является воздействие на овицидную активность вшей, необходим интервал в 7 дней между двумя применениями.

Ремов не содержит нейротоксических фосфорорганических инсектицидов, поэтому не воздействует на специфические ферменты гнид. Ремов воздействует на вшу посредством физического процесса, накрывая и нарушая способность вши справляться со своим водным балансом, так что насекомое не способно выводить излишки воды. Действие Диметиконане уменьшается против вшей, устойчивых к инсектицидам.

Фармакокинетика

Ремов наносится местно на пораженную область, однако диметикон мало или вовсе не впитывается в кожу.

Показания к применению

Ремов предназначен для ликвидации вшей.

Способ применения и дозы

Только для местного наружного применения

Взрослые и дети (в возрасте от шести месяцев и старше).

Нанести достаточное количество лосьона на сухие волосы от корней до кончиков, таким образом, чтобы средство покрыло всю площадь волосистой части головы. Распределить раствор равномерно от корней до кончиков. Дать волосам высохнуть естественным путем. Оставить Ремов на волосах в течение, как минимум, 8 часов или на всю ночь. Промыть волосы обыкновенным шампунем и тщательно прополоскать водой. Повторить процедуру через семь дней.

Применение лосьона у детей в возрасте до шести месяцев нужно проводить только под наблюдением врача.

Побочные действия

Диметикон, обычно, хорошо переносится. Могут возникнуть незначительные побочные действия, как раздражение кожи, зуд или шелушение кожи головы и раздражение вокруг глаз.

Сообщалось о единичных случаях выпадения волос.

Признаки реакций гиперчувствительности, включают сыпь, крапивницу, генерализованный зуд и затруднения дыхания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействие диметикона с другими медицинскими препаратами неизвестно.

Особые указания

Препарат следует прекратить при первом появлении кожной сыпи или любых других признаков местной или общей гиперчувствительности. При появлении каких-либо признаков повышенной чувствительности (например, сыпь, крапивница, генерализованный зуд, затруднение дыхания), препарат следует немедленно смыть при помощи шампуня, если симптомы не будут устранены, обратиться к врачу.

Только для наружного применения.

Избегайте контакта с глазами, при случайном попадании в глаза, промойте водой.

Держите волосы подальше от источников воспламенения, особенно открытого пламени и горящих сигарет, при лечении с Ремов. Обработанные волосы могут легко гореть при воспламенении.

Беременность и лактация:

Сведения о том, что Ремов не может применяться во время беременности отсутствуют.

Способность управлять транспортным средством и использовать другие механизмы:

Неизвестно

Передозировка

Выраженных симптомов передозировки не было выявлено.

Маловероятно, что Ремов лосьон попадет в кровоток через порезы кожных покровов, однако если подобная ситуация случилась, по имеющимся данным препарат быстро выводится из организма в неизменном виде. Если лосьон был случайно проглочен внутрь, так же имеется информация, что не затрагивает особые вопросы безопасности.

Специальные меры не требуются.

Форма выпуска

50 мл лосьона в ПЭТ флаконе вместе с распылителем и инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Препарат не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Местоположение

SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ИП ООО "BARAKA DORI FARM"

100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, д. 16А.

Тел.: +99878 1509797; +99893 3888782;

факс: +99878 1509787.

Email: pharmacovigilance@kusumhealthcare.uz