



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ КАТАРИЯ®

Торговое название препарата: Катария®

Действующее вещество (МНН): натрия цитрат

Лекарственная форма: гранулы для приготовления раствора для приема внутрь

Состав:

Каждое саше содержит:

активное вещество: натрия цитрат 4 г;

вспомогательные вещества: сахароза, сахарин натрия и вкусовая добавка клюква 191121.

Описание: сыпучие гранулы от белого до почти белого цвета со вкусом клюквы.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие препараты для лечения урологических заболеваний.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Натрия цитрат метаболизируется в бикарбонат, который способствует регрессии дизурии, которая наблюдается при цистите. Уменьшает кислотность мочи, вызывая ее подщелачивание.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Облегчение симптомов цистита у женщин.

Способ применения и дозы

Применение у женщин

Содержимое одного саше растворить в стакане воды.

Принимать внутрь по 1 саше 3 раза в сутки в течение 48 ч.

Приготовленный раствор необходимо использовать сразу.

Применение у мужчин и детей

Не рекомендуется.

Побочные действия

Конвенция MedDRA по частоте:

Очень часто ($\geq 1/10$);

Часто ($\geq 1/100$ и $< 1/10$);

Не часто ($\geq 1/1000$ и $< 1/100$);

Редко ($\geq 1/10000$ и $< 1/1000$);

Очень редко ($< 1/10000$);

Неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).

Нарушения со стороны иммунной системы: очень редко - сыпь.

Желудочно-кишечные нарушения: очень редко - боль в животе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к цитрату натрия и другим компонентам препарата.

Противопоказан пациентам с сахарным диабетом, сердечными заболеваниями,

артериальной гипертензией, заболеваниями почек или пациентам, соблюдающим диету с низким содержанием соли.

Лекарственные взаимодействия

Неизвестно.

Особые указания

Если симптомы не проходят после двух дней применения, необходимо обратиться к врачу.

Не превышать рекомендуемые дозы.

Содержит сахарозу. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями непереносимости фруктозы, синдрома мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточности сахарозы-изомальтазы не должны принимать это лекарственный препарат.

Препарат содержит в одной дозе 939 мг натрия. Это следует учитывать у пациентов, соблюдающих диету с ограничением натрия.

Применение при беременности и период лактации

Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять транспортным средством и другими механизмами

Не влияет.

Передозировка

В случае случайной передозировки применяется симптоматическое лечение.

Форма выпуска

Гранулы натрия цитрата упакованы в ламинированные саше из 4-х слойной фольги.

Каждое саше содержит 5,6 г гранул, по 6 саше в картонной упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Адрес производства

Plot No. M-3, Indore Special Economic Zone,

Phase-II, Pithampur, Dist.-Dhar, Madhya Pradesh-454774, Индия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, д. 16А

Тел.: + (99878) 150 97 97; факс: +(99878) 150 97 87

Сот.: + (99893) 388 87 82

E-mail: pv@kusum.uz