



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПАНАШ®

**Торговое название препарата:** Панаш®

**Действующее вещество (МНН):** тиоколхикозид

**Лекарственная форма:** крем для наружного применения

**Состав:**

Каждый грамм крема содержит:

*активное вещество:* тиоколхикозид 2,5 мг;

*вспомогательные вещества:* карбомер (карбопол 940), динатрия эдетат, спирт изопропиловый, пропиленгликоль, глицерол (глицерин), гидроксид натрия пеллеты, легкий жидкий парафин, изопропилмиристат, полиоксил 40 гидрогенизированное касторовое масло, очищенная вода.

**Описание:** вязкий крем от бледно-желтого до желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** миорелаксант центрального действия

**Код ATX:** M03BX05

### Фармакологические свойства

#### Фармокодинамика

Тиоколхикозид - это полусинтетическое производное колхикозида с миорелаксирующей фармакологической активностью.

#### Механизм действия

*In vitro* тиоколхикозид связывается с ГАМК-А и стрихнин чувствительными глициновыми рецепторами. Тиоколхикозид, действующий как антагонист ГАМК-А рецептора, может оказывать свое эффективное миорелаксирующее действие с помощью регуляторных комплексных механизмов на супраспинальном уровне, однако его глицинергические механизмы действия не могут быть исключены. Характеристики взаимодействия тиоколхикозида с ГАМК-А рецепторами такие же как и с производным глюкуронида, который является основным метаболитом в кровотоке в качественном и количественном выражении.

#### Фармакокинетика

После местного применения рекомендованных доз Панаш® крема плазменный уровень тиоколхикозида был ниже минимального уровня.

Это доказывает, что при местном применении не происходит системное всасывание, а значит, это обеспечивает хорошую переносимость.

### Показания к применению

Пояснично-крестцовый радикулит (боли в спине), цервикобрахиалгия (боль и контрактура мышц шеи, плечей, верхних конечностей), устойчивая ригидность затылочных мышц, посттравматический и послеоперационный болевой синдромы.

Адьювантная терапия болезненной мышечной контрактуры при острой патологии структур позвоночника у взрослых и подростков от 16 лет и старше.

### Способ применения и дозы

#### Дозировка

Крем в достаточном количестве для пораженного участка слегка втирают в пораженную и близлежащую область кожи 2-3 раза в день. Продолжительность лечения варьируется,

однако курс 7-10 дней оказывается достаточным для выздоровления. Продолжительность курса определяется врачом.

#### *Дети.*

Не использовать препарат у детей до 17 лет.

#### *Способ применения*

Крем для местного применения

#### **Побочные действия**

- имеются сообщения о высыпаниях и кожной сыпи.
- в редких случаях сообщалось о сонливости (см. «Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами»).

#### **Противопоказания**

Тиоколхикозид не следует применять при:

- повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата;
- вялый паралич;
- гипотония мышц;
- весь период беременности;
- период лактации;
- женщинам детородного потенциала, не использующим контрацепцию;
- тиоколхикозид назначают с осторожностью с приступами в анамнезе.

#### **Лекарственные взаимодействия**

Не известно.

#### **Особые указания**

Тиоколхикозид не рекомендуется для применения у детей.

В случае возникновения побочных эффектов дозу нужно уменьшить.

Особенно при длительном применении препаратов для местного применения может привести к повышенной чувствительности организма. В таком случае необходимо остановить лечение и провести соответствующую терапию.

Панаш® крем содержит пропиленгликоль, что может вызвать раздражение кожи.

#### *Применение при беременности и в период лактации*

##### *Беременность*

Данные о применении тиоколхикозида у беременных женщин ограничены. Поэтому потенциальные факторы риска для эмбриона и плода остаются неизвестными.

В опытах на животных были обнаружены тератогенные эффекты.

Панаш® крем противопоказано применять при беременности и у женщин детородного возраста, не использующих контрацепцию.

##### *Лактация*

В связи с тем, что тиоколхикозид проникает в грудное молоко, его применение в период кормления грудью противопоказано.

##### *Фертильность*

Исследования фертильности у крыс не выявили влияние на способность к воспроизведению потомства в дозах до 12 мг/кг, т.е. в тех дозах, которые не имеют клинического эффекта. Тиоколхикозиды и его метаболиты в разных концентрациях обладают способностью вызывать анеугенность, что может быть фактором риска снижения фертильности у человека.

**Способность управлять транспортным средством и использовать другие механизмы:**  
Хотя после применения Панаш® крема сонливость является редким побочным эффектом, рекомендуется учитывать возможность ее появления.

**Передозировка**

Данных о симптомах передозировки среди пациентов, получающих терапию тиоколхикозидом, не имеется. При появлении симптомов передозировки рекомендуется медицинское наблюдение и симптоматическая терапия.

**Форма выпуска**

По 30 г крема в гибкой алюминиевой тубе. Каждая туба вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать!

**Срок годности**

2 года.

Препарат не следует применять после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Производитель**

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

**Адрес**

SP-289(A), RILCO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия.

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100022, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули, д. 91.

Тел.: +998 (78) 150 97 97; +998 (93) 388 87 82;

Факс: +998 (78) 1509787

E-mail: [pv@kusum.uz](mailto:pv@kusum.uz)

Web-сайт: [kusum.uz](http://kusum.uz)