

## ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ПАНАШ®

**Препаратнинг савдо номи:** Панаш®

**Таъсир этувчи модда (ХПН):** тиоколхикозид

**Дори шакли:** сиртга қўллаш учун крем

**Таркиби:**

Ҳар бир грамм крем қуйидагиларни сақлайди:

*фаол модда:* 2,5 мг тиоколхикозид;

*ёрдамчи моддалар:* карбомер (карбопол 940), динатрий эдетати, изопропил спирти, пропиленгликоль, глицерол (глицерин), натрий гидроксиди пеллети, енгил суяқ парафин, изопропилмиристанат, полиоксил 40 гидрогенизация қилинган канакунжут мойи, тозаланган сув.

**Таърифи:** оч сарикдан сарик ранггача бўлган қовушқоқ крем.

**Фармакотерапевтик гуруҳи:** марказий таъсирга эга миорелаксант

**АТХ коди:** M03BX05

### Фармакологик хусусиятлари

#### Фармакодинамикаси

Тиоколхикозид- бу миорелаксацияловчи фармакологик фаолликка эга бўлган колхикозиднинг ярим синтетик ҳосиласи.

#### Таъсир механизми

*In vitro* шароитларда тиоколхикозид ГАМК-А ва стрихнинга сезувчан глицин рецепторлари билан боғланади. ГАМК-А – рецепторининг антагонисти каби таъсир қилувчи тиоколхикозид ўзининг самарали миорелаксацияловчи таъсирини супраспинал даражада регулятор комплекс механизмлари ёрдамида кўрсатиши мумкин. Аммо унинг глицинергик таъсир механизмларини истисно қилиниши мумкин эмас. Тиоколхикозидни ГАМК-А – рецептори билан ўзаро таъсирини характеристикаси қон оқимида сифат ва миқдорий ифодаланган асосий метаболит ҳисобланган глюкуронид ҳосиласи билан бир хилдир.

#### Фармакокинетикаси

Панаш® кремни тавсия қилинган дозаларда маҳаллий қўллангандан кейин тиоколхикозиднинг плазмадаги даражаси минимал даражадан паст бўлган. Бу маҳаллий қўлланганда тизимли сўрилишни юз бермаслигини кўрсатади, демак бу яхши ўзлаштираолинишини таъминлайди.

### Қўлланилиши

Бел-думғаза радикулит (белда оғриқ), цервикобронхиалгия (бўйин, елка, қўл мушакларида оғриқ ва контрактура), энса мушакларини турғун ригидлиги, жароҳатдан кейинги ва операциядан кейинги оғриқ синдромида қўлланилади.

Катталарда ва 16 ёшгача ва ундан катта бўлган ўсмирларда умуртқа поғонасининг ўткир патологиясида оғриқли мушак контрактурасини адьювант даволашда қўлланилади.

### Қўллаш усули ва дозалари

#### Дозалари

Кремни терининг шикастланган соҳаси учун шикастланган ва яқин жойлашган соҳага етарли миқдорда кунига 2-3 марта бироз ишқалаб суртилади. Даволаш давомийлиги

ўзгарувчан, аммо 7-10 кунлик даволаш курс соғайиш учун етарли ҳисобланади. Даволаш курсининг давомийлигини шифокор аниқлайди.

*Болалар.*

Препаратни 17 ёшгача бўлган болаларда қўлланилмасин.

*Қўллаш усули*

Маҳаллий қўллаш учун крем.

### **Ножўя таъсирлари**

- тошмалар ва тери тошмалари тўғрисида хабарлар мавжуд.
- кам ҳолларда уйқучанлик тўғрисида хабар берилган (“Автомобилни ва бошқа механизмларни бошқариш қобилиятига таъсирига” қаранг).

### **Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар**

Тиоколхикозидни қуйидаги ҳолатларда қўллаш керак эмас:

- препаратнинг фаол моддасига ёки ёрдамчи компонентларига юқори сезувчанлик;
- периферик фалаж;
- мушаклар гипотонияси;
- ҳомиладорликни барча даврида;
- лактация даврида;
- контрацепцияни қўлламайдиган бола туғиш потенциали бўлган аёлларда қўллаш мумкин эмас.
- анамнезида хуружлари бўлган тиоколхикозидни эҳтиёткорлик билан буюрилади.

### **Дориларнинг ўзаро таъсири**

Номаълум.

### **Махсус кўрсатмалар**

Тиоколхиокзид болаларда қўллаш учун тавсия қилинмайди.

Ножўя самаралар пайдо бўлган ҳолларда дозани камайтириш керак.

Маҳаллий қўллаш учун препаратлар айниқса узоқ вақт қўлланган ҳолларда, организмнинг юқори сезувчанлигига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолларда даволашни тўхтатиш ва тегишли даволашни ўтказиш керак.

Панаш® креми пропиленгликол сақлайди, бу терини таъсирланишини чақириши мумкин.

#### ***Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши***

*Ҳомиладорлик*

Тиоколхикозидни ҳомиладор аёлларда қўллаш тўғрисида маълумотлар чекланган. Шунинг учун эмбрион ва ҳомила учун потенциал хавф омиллари номаълум бўлиб қолмоқда.

Ҳайвонларда ўтказилган тажрибаларда тератоген самараси аниқланган. Панаш® кремани ҳомиладорликда ва туғруқ ёшидаги контрацепцияни қўлламайдиган аёлларда қўллаш мумкин эмас.

*Лактация*

Тиоколхикозидни кўкрак сутига кириш туфайли уни эмизиш даврида қўллаш мумкин эмас.

*Фертилик*

Каламушларда фертиликни ўрганиш юзасидан тадқиқотларда, уни 1 мг/кг бўлган дозада, яъни клиник самарага эга бўлмаган дозаларда қўлланганда насл қолдириш қобилиятига таъсирини аниқланмади. Тиоколхикозид ва унинг метаболитлари турли концентрацияларда анеугенликни (хромосомаларда бузилишларни чақириш хусусияти) чақириш хусусиятига эга, бу одамда фертиликни пасайтириш хавф омилли бўлиши мумкин.

**Транспорт воситалари бошқариш ва бошқа механизмларни ишлатиш қобилиятига таъсири:**

Гарчи Панаш® кремини қўллангандан кейин уйқучанлик кам ҳолларда учрайдиган ножўя самара ҳисоблансада, уни пайдо бўлиш эҳтимолини ҳисобга олиш тавсия қилинади.

**Дозани ошириб юборилиши**

Тиоколхикозид билан даволанган пациентлар ўртасида дозани ошириб юборилиши симптомлари тўғрисида маълумотлар йўқ. Дозани ошириб юборилиш симптомлари пайдо бўлганида тиббий кузатув ва симптоматик даволаш тавсия қилинади.

**Чиқарилиш шакли**

30 граммдан эгилувчан алюминий тубада. Ҳар бир туба тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон ўрамда.

**Сақлаш шароитлари**

Қурук, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Болалар ололмайдиغان жойда сақлансин. Музлатилмасин!

**Яроқлилиқ муддати**

2 йил.

Препаратни яроқлилиқ муддати ўтгач қўлланилмасин.

**Дорихоналардан бериш тартиби**

Рецепт бўйича.

**Ишлаб чиқарувчи**

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

**Манзил**

SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Ҳиндистон.

**Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:**

“BARAKA DORI FARM” МЧЖ ХК

100022, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Кичик Халка Йули кўчаси, 91-уй.

Тел.: +998 (78) 150 97 97; +998 (93) 388 87 82;

Факс: +998 (78) 1509787

E-mail: [pv@kusum.uz](mailto:pv@kusum.uz)

Web-сайт: [kusum.uz](http://kusum.uz)