

«УТВЕРЖДЕНО»  
Фармакологический комитет  
Государственного учреждения  
«Центр безопасности фармацевтической  
продукции» Министерства здравоохранения  
Республики Узбекистан  
«31» 05 2024 г. № 14

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕМОВ

**Торговое название препарата:** Ремов

**Действующее вещество (МНН):** диметикон

**Лекарственная форма:** лосьон 4%

**Состав:**

Каждый мл лосьона содержит:

*активное вещество:* диметикон 40 мг;

*вспомогательные вещества:* циклометикон 5;

**Описание:** чистый, прозрачный, однородный лосьон, без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** эктопаразитицид, вкл. противочесоточное средство

**Код АТХ:** P03AX05

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика**

Диметикон используется во многих фармацевтических и косметических препаратах. Было установлено, что 4% концентрация влияет на физико-физиологическую активность вшей. Менее активным является воздействие на овицидную активность вшей, необходим интервал в 7 дней между двумя применениями.

Лосьон Ремов не содержит нейротоксических фосфорорганических инсектицидов, поэтому не действует на специфические ферменты гнид. Лосьон Ремов воздействует на вшей посредством физического процесса, накрывая и нарушая способность вши справляться со своим водным балансом, так что насекомое не способно выводить излишки воды. Активность диметикона не снижается в отношении головных вшей, устойчивых к инсектицидам.

#### **Фармакокинетика**

Лосьон Ремов наносится местно на пораженную область, при этом диметикон мало или вовсе не всасывается через кожу.

### **Показания к применению**

Лосьон Ремов показан для эрадикации головных вшей.

### **Способ применения и дозы**

Только для местного наружного применения.

*Взрослые и дети (в возрасте от шести месяцев и старше)*

Нанести достаточное количество лосьона на сухие волосы от корней до кончиков, таким образом, чтобы средство покрыло всю площадь волосистой части головы. Распределить раствор равномерно от корней до кончиков. Дать волосам высохнуть естественным путем. Оставить лосьон Ремов на волосах в течение, как минимум, 8 часов или на всю ночь. Промыть волосы обычным шампунем и тщательно прополоскать водой. Повторить процедуру через семь дней.

Применение лосьона у детей в возрасте до шести месяцев нужно проводить только под наблюдением врача.

### **Побочные действия**

Диметикон, обычно, хорошо переносится. Могут возникнуть незначительные побочные действия, такие как раздражение кожи, зуд или шелушение кожи головы и раздражение вокруг глаз.

Сообщалось о единичных случаях выпадения волос.

Признаки реакций гиперчувствительности, включают сыпь, крапивницу, генерализованный зуд и затруднения дыхания.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

### **Лекарственные взаимодействия**

Взаимодействие диметикона с другими медицинскими препаратами неизвестно.

### **Особые указания**

Применение препарата следует сразу же прекратить при первом появлении кожной сыпи или любых других признаков местной или общей гиперчувствительности. При появлении каких-либо признаков гиперчувствительности (например, сыпь, крапивница, генерализованный зуд, затруднение дыхания), препарат следует немедленно смыть при помощи шампуня, если симптомы не будут устранены, обратиться к врачу.

Только для наружного применения.

Избегайте контакта с глазами, при случайном попадании в глаза, промойте водой.

Лосьон Ремов, нанесённый на волосы, воспламеняется при прямом контакте с открытым пламенем или другим источником воспламенения, поэтому во время применения волосы следует держать вдали от источника открытого огня или других источников воспламенения.

На упаковке и вложенной в неё инструкции указывают:

«Предупреждение: Обработанные лосьоном Ремов волосы следует держать вдали от источников воспламенения, особенно открытого огня и горящих сигарет. Обработанные волосы могут легко воспламеняться, при контакте с огнём».

### **Применение при беременности и в период лактации**

Данные, позволяющие предположить, что лосьон Ремов нельзя применять во время беременности отсутствуют.

### **Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами**

Неизвестно.

### **Передозировка**

Выраженных симптомов передозировки не было выявлено.

Маловероятно, что лосьон Ремов попадет в кровоток через порезы кожных покровов, однако если подобная ситуация случилась, по имеющимся данным препарат быстро выводится из организма в неизменном виде. Если лосьон был случайно проглочен, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что особых проблем с безопасностью не возникает.

Специальные меры не требуются.

### **Форма выпуска**

50 мл лосьона в ПЭТ флаконе вместе с распылителем и инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

**Адрес производства**

SP-289(A), RICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Индия

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по  
качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан**

ИП ООО «BARAKA DORI FARM»

100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка Йули 91

Тел.: + 998 78 150 97 97; факс: + 998 78 150 97 87

Сот.: + 998 93 388 87 82

E-mail: [pv@kusum.uz](mailto:pv@kusum.uz)

Web-сайт: [kusum.uz](http://kusum.uz)