

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА РЕМОВ

Препаратнинг савдо номи: Ремов

Таъсир этувчи модда (ХПН): диметикон

Дори шакли: лосьон

Таркиби:

Ҳар бир мл лосьон қуйидагиларни сақлайди:

фаол модда: 4% ли диметикон;

ёрдамчи модда: циклометикон 5.

Таърифи: тоза, тиниқ, бир хил турдагим ҳидсиз лосьон.

Фармакотерапевтик гуруҳи: эктопаразитицид, шу жумладан қичмага қарши дори воситаси.

АТХ коди: P03AX05.

Фармакологик хулари

Фармакодинамикаси

Диметикон кўплаб фармацевтик ва косметик дори воситаларида ишлатилади. 4% концентрацияси битларнинг физик-физиологик фаоллигига таъсир кўрсатиши тасдиқланган. Битларнинг овицид фаоллигига таъсир камроқ фаол ҳисобланади, икки марта қўлланиш ўртасида 7 кунлик оралик вақт сақланиши керак.

Ремов таркибида нейротоксик фосфорорганик инсектицидлар мавжуд эмас, шу туфайли сиркаларнинг специфик ферментларига таъсир кўрсатмайди. Ремов битларга ўз сув мувозанатини эплаш қобилятини бартараф этган ва бузган ҳолда жисмоний жараён орқали таъсир кўрсатади, шу туфайли ҳашарот ортиқча сувни чиқариб ташлаш қобилятини йўқотади. Диметиконаннинг инсектицидларга чидамли битларга қарши таъсири камаяди.

Фармакокинетикаси

Ремов шикастланган жойга маҳаллий суртилади, бироқ диметикон териға кам сингиб кетади ёки умуман сингимайди.

Қўлланилиши

Ремов битларни бартараф қилиш учун қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Фақат маҳаллий ташқи қўлланиш учун мўлжалланган.

Катталар ва болалар (олти ойлик ва ундан катта ёшдагилар).

Қуруқ сочларға восита бошнинг бутун тукли қисми майдонини қоплаб оладиган тарзда соч илдизидан учигача етарли миқдорда лосьон суртилади. Эритма соч илдизидан учигача бир хилда тақсимлаб чиқилади. Сочлар табиий равишда қуритилади. Ремов сочларда энг камида 8 соат ёки бутун тун бўйи қолдирилади. Сочлар оддий шампунь билан юйиб ташланади ва сув билан яхшилаб чайиб олинади. Ушбу муолажа етти кундан кейин тақрорланади. Олти ойлик ёшгача болаларда лосьон фақат шифокор кузатуви остида қўлланиши керак.

Ножўя таъсирлари

Диметикон, одатда, беморлар томонидан яхши чидамлилиқка эгадир. Тери қизариши, қичиши ёки бош териси шўралаши ва кўз атрофи яллиғланиши каби бироз ножўя таъсирлар пайдо бўлиши мумкин.

Соч тўкилиши айрим ҳолатлари тўғрисида маълум қилинган.

Ўта сезувчанлик реакциялари аломатлари тошмани, эшак еми касаллигини, генерализацияланган қичимани ва нафас олиш қийинлашишини ўз ичига олади.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Дори воситаси таркибий моддаларидан бирига юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Диметиконнинг бошқа тиббий дори воситалари билан ўзаро таъсири маълум эмас.

Махсус кўрсатмалар

Тери тошмаси ёхуд жузъий ёки умумий ўта сезувчанликнинг бошқа ҳар қандай аломатлари биринчи пайдо бўлганда дори воситасини қабул қилиш тўхтатилиши керак. Юқори сезувчанликнинг бирон-бир симптомлари (масалан, тошма, эшак еми касаллиги, генерализацияланган қичима, нафас олиш қийинлашиши) пайдо бўлганда, дори воситасини шампунь ёрдамида дарҳол ювиб ташлаш керак, агар симптомлар бартараф бўлмаса, шифокорга мурожаат қилиш керак.

Фақат ташқи қўлланиш учун мўлжалланган.

Кўзга тушишига йўл қўйманг, тасодифан кўз тушган ҳолатда, сув билан ювиб ташланг.

Ремов билан даволанишда сочингизни алангаланиш манбаларидан, айниқса, очиқ оловдан ва тутатилган сигареталардан узоқроқ тутинг. Ишлов берилган сочлар аланга олдида осон ёниб кетиши мумкин.

Ҳомиладорлик ва лактация:

Ремов ҳомиладорлик вақтида қўлланиши мумкин эмаслиги тўғрисида маълумотлар йўқ.

Транспорт воситалари ва бошқа хавфли механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Маълум эмас.

Дозани ошириб юборилиши

Ортиқча дозаланишнинг ифодаланган симптомлари аниқланмаган.

Ремов лосьоннинг тери қопламалари кесилиши орқали қон оқимида тушиши эҳтимоли кам, бироқ агар бундай ҳолатлар юз берса, мавжуд маълумотларга кўра, дори воситаси тезда организмдан ўзгармаган шаклда ажралиб чиқади. Агар лосьон тасодифан ютиб юборилган бўлса, алоҳида хавфсизлик масалаларига дахл қилмаслиги тўғрисида ҳам маълумотлар келган.

Махсус чоралар талаб қилинмайди.

Чиқарилиш шакли

50 мл лосьон ПЭТ флаконда, пуркагич ва тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан картон ўрамда.

Сақлаш шароити

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

3 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихонадан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи
Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Манзили
SP-289(A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), Ҳиндистон.

**Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситасини сифати бўйича эътирозларни
(таклифлар) қабул қилувчи ташкилотнинг номи ва манзили**

“BARAKA DORI FARM” МЧЖ ХК

100100, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 16 А-уй.

Тел.: +(99878) 150-97-97; факс: +(99878) 150-97-87

Уяли тел.: +(99893) 388-87-82

pharmacovigilance@kusumhealthcare.uz